


Colelitiasis: Síntomas y Riesgos



De los pacientes con colelitiasis no tienen síntomas.

y su diagnóstico es basado en estudios de imagen, pedidos por otras razones (ecografía)




20
años

de ese 80%, 1 de cada 3 pacientes, podrán presentar síntomas en 20 años

2%

Posibilidad de complicaciones por cada año de presencia de síntomas.

Colico Biliar



De Inicio abrupto en cuadrante superior derecho del abdomen.

Suele irradiarse a escápula derecha (hombro derecho).

Cierto tipo de comida puede precipitar el dolor, y que disminuya con ayuno



Dura aprox. en 30 minutos a 3 hora.



Complicaciones

20% de riesgo en 2 años de producir colecistitis (calculos en vesícula biliar), en pacientes sintomáticos

Infección en vía biliar (Colangitis) o inflamación de órganos vecinos como el páncreas (Pancreatitis).

Cáncer de vesícula biliar, con un riesgo menor al 1 %

Colelitiasis

Escanea
Código
Qr

www.cirujano.ec



*McGee, S. (Zn.d.). Evidence-based physical diagnosis. 4th ed. Philadelphia: Steven McGee, pp 445-455

info@cirujano.ec



Hospital de los Valles.
Consultorio 240
Cumbayá - Ecuador



+593 (2) 3 514301



+593 (9) 9 930 5350

Dr. Fernando Torres Jaramillo
FACS
Cirugía General y laparoscópica
Cirugía Bariátrica (Obesidad) -
Metabólica

